

මෙම පෙති භාවිතයේදී වැදගත් වන කරුණු

- මෙම පෙති ගැනීමට පෙර කුමන හෝ ආහාරයක් ගැනීම (වනම් නිරාහාරව පෙති නොගැනීම)
- මෙම පෙති භාවිතයෙන් පසු නැවත සිදුවන අනාරක්ෂිත ලිංගික චක්චිම් සඳහා මෙයින් ආරක්ෂාවක් නොලැබේ
- පෙති ගැනීමෙන් අනතුරුව එම කාන්තාව ගැබ් ගතහොත් මෙම පෙති ගැනීම නිසා දරු ගැබ්ට හානියක් සිදු නොවේ
- ගැබ් ගත් කාන්තාවක් හදිසි පවුල් සැලසුම් පෙති භාවිතා කිරීම නිසා ඇයට ගබ්සාවක් සිදු නොවේ
- මෙම පෙති භාවිතා කිරීමෙන් පසු පළමු මාසික ඔසප් වීම සාමාන්‍ය අන්දමට හෝ නියමිත දිනට දින කිහිපයකට පෙර හෝ පසුව සිදුවිය හැකිය
- එහෙත් මාසික ඔසප්වීම සතියකට වඩා ප්‍රමාද වුවහොත් හෝ ඒ පිළිබඳව කිසියම් ගැටළුවක් ඇත්නම් හෝ වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න



හදිසි පවුල් සැලසුම් ක්‍රමයක් වශයෙන් අන්ත: ගර්භාෂ තැන්පතුව භාවිතා කළ හැකිය. ඒ සඳහා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් හෝ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන්ගේ උපදෙස් පතන්න

හදිසි පෙති ලබා ගැනීමෙන් පසුව වුවද, අන්ත: ගර්භාෂ තැන්පතුව භාවිතා කළ හැකිය

වැඩිදුර උපදෙස් සඳහා හමුවන්න

- සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන්
- වෛද්‍ය නිලධාරීන්
- ලියාපදිංචි වෛද්‍ය නිලධාරීන්
- මහජන සෞඛ්‍ය හෙද සෞභාග්‍යූරියන්
- පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන්

සුවසර්‍ය 1999



සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ, පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශයේ සහ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ ප්‍රකාශනයකි

අනපේක්ෂිත ලිංගික ඇසුරක් සිදු වුවහොත්



හදිසි පවුල් සැලසුම් ක්‍රම


පසු සංවාස (හදිසි) පෙති අන්ත: ගර්භාෂ තැන්පතුව

බලාපොරොත්තු නොවූ ලිංගික චක්චීමකින් පසුව කාන්තාවකට ඇති වන්නේ අනවශ්‍ය ගැබ් ගැනීමක් ගැන බියයි.

ඒ සඳහා ඔබට විසඳුම් 2 ක් ඇත

- පසු සංවාස (හදිසි) පෙති ගැනීම
- අන්ත: ගර්භාෂ තැන්පතුව

හදිසි පෙති යනු මොනවාද?



- බලාපොරොත්තු නොවූ ලිංගික ඇසුරකින් පසු ගැබ් ගැනීමක් වළක්වා ගැනීමට ගත හැකි පෙති වර්ගයකි
- මෙම පෙති වල අඩංගු වන්නේ ප්‍රොපේස්ටරෝන් හෝමෝනයට සමාන සංයෝගයකි
- මෙය මි.ග්‍රෑ. 0.75 පෙති දෙකක් ලෙස හෝ මි.ග්‍රෑ. 1.5 ක තනි පෙත්තක් ලෙස ලබා ගත හැකිය

හදිසි පෙති/පෙත්ත සුදුසු කාහට ද?

- කිසිදු පවුල් සැලසුම් ක්‍රමයක් භාවිතා නොකර ලිංගිකව චක්චු අවස්ථාවක දී
- ලිංගික චක්චීමකදී රබර් කොපු (කොන්ඩම්) ඉරියාම, ගැලවී යාම හෝ නිවැරදි ලෙස භාවිතා නොකිරීම වැනි අවස්ථා වලදී
- ස්ත්‍රී දූෂණයක් සිදුවූ අවස්ථාවකදී

ක්‍රියාකාරීත්වය

- බිම්බ පිටවීම වැළැක්වීම මගින් ගැබ් ගැනීම වළක්වයි

හදිසි පෙති භාවිතා කළ යුත්තේ කෙසේද?

- බලාපොරොත්තු නොවූ ලිංගික චක්චීමකින් පසු හැකි ඉක්මනින් මෙය ගත යුතුය. දින 5 කට පසු මෙම ක්‍රමය සාර්ථක නොවේ
- මෙම පෙති හැකි ඉක්මනින් ගැනීමෙන් සාර්ථකත්වය වැඩිකර ගත හැකිය

මෙම පෙති ගැනීමෙන් පැය 2 ක් ඇතුළත දී වමනය ඇති වුවහොත් හැකි ඉක්මනින් ඒ වෙනුවට අලුතින් පෙති ගැනීම අත්‍යවශ්‍යය. (පැකට්ටුවේ පෙති 2 ක් තිබේ නම් හැවත පෙති 2 ම ලබා ගත යුතුය)

සාර්ථකත්වය

- සාර්ථකත්වය සාමාන්‍යයෙන් 99% ක් පමණ දක්වා වේ

මෙම පෙති නිතර නිතර භාවිතා නොකළ යුතුය නිතර භාවිතා කිරීමට සිදුවේ නම් නිසි පවුල් සැලසුම් ක්‍රමයකට යොමුවන්න

අතුරු ආබාධ

- පහත දැක්වෙන ප්‍රධාන අතුරු ආබාධ ඇතිවිය හැකිය. ඒවා අනතුරුදායක නොවන අතර දින කිහිපයකින් මඟ හැරී යනු ඇත.
- ඔක්කාරය
 - හිසරදය
 - ක්ලාන්තය
 - පියයුරු වල වේදනාව
 - මාසික ඔසප් වකුයේ අක්‍රමිකතාවයක්

මෙම පෙති සාමාන්‍ය (නිතිපතා) පවුල් සැලසුම් ක්‍රමයක් ලෙස භාවිතා කිරීම කිසිසේත්ම සුදුසු නොවේ