

සැලකිය යුතුයි

සැත්කම් පසු

- දින දෙකක් පමණ ගතවන තුරු විවේක ගැනීම සුදුසුය. එහෙත් විදිනෙදා ගේ දොර වැඩ කටයුතු ඔබට කර ගත හැකිය
- දින 7ක් පමණ බර වැඩ කිරීමෙන් වැළකී සිටීම සුදුසුය (උදා: දර පැලීම, වතුර ඇදීම වැනි)
- උදරයේ වේදනාවක්, යටිබඩ ප්‍රදේශයේ සුළු අපහසුතාවයන් ඇතිවිය හැකිය. මේවා ඉතා ඉක්මණින් මඟ හැරියන අතර සරල වේදනා නාශකයක් පානය කර වේදනාව හැකි කර ගැනීමට පුළුවන

සැත්කම් පසු ඇතිවන ඕනෑම අපහසු තත්ත්වයකදී ළඟම ඇති රෝහලෙන්/ සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානයෙන් උපදෙස් ලබා ගන්න

සාර්ථකත්වය

- 99% ක ටත් වඩා වැඩියි

නැවත නැවත පවුල් සැලසුම් ක්‍රම ලබා ගැනීම අවශ්‍ය නොවන නිසා, ස්ත්‍රී ස්ථිර සැත්කම් පසු ඔබට සැහැල්ලු ජීවිතයක් පවුල් දිවියකට මඟපාදා ගත හැකිය

වැඩිදුර උපදෙස් සඳහා හමුවන්න

- සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන්
- වෛද්‍ය නිලධාරීන්
- ලියාපදිංචි වෛද්‍ය නිලධාරීන්
- මහජන සෞඛ්‍ය හෙද සෞනොයුරියන්
- පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන්

ක්‍රවිකර්ය 1999



සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ, පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශයේ සහ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ ප්‍රකාශනයකි


නිසි කල රිසි ලෙස දරු සම්පත **ජීවිතය** යුග දිවියක් උදෙසා...



ස්ත්‍රී ස්ථිර සැත්කම

ස්ත්‍රී ස්ථීර සැත්කම යනු කුමක්ද?

- ස්ත්‍රීයකගේ ශරීරය තුළ ඩිම්බ කෝෂයේ සිට ගර්භාෂය දක්වා ස්ත්‍රී බීජ ගමන් කරන කුඩා නාලයක් ඇත. එය පැලෝපියා නාලය නම් වේ
- ස්ත්‍රී ස්ථීර සැත්කමකදී එය අවහිර කිරීම සිදු කරයි. එමඟින් ස්ත්‍රී සහ පුරුෂ බීජ එක්වීම සිදු නොවන හෙයින් අභව්‍ය ගැබ්ගැනීම් වළක්වයි



මෙය සුදුසු කාභටද?

- පවුලකට අවශ්‍ය තරම් දරුවන් ගණනක් ලබා සිටී නම් මෙම ක්‍රමය සුදුසුය.

ස්ත්‍රී ස්ථීර සැත්කම සඳහා තිබිය යුතු අවම සුදුසු කම්

- දරුවන් දෙදෙනකු වත් සිටීම
- දෙවන දරුවාගේ වයස අවුරුදු දෙකක් වත් වීම
- ස්ත්‍රීයගේ වයස අවුරුදු 26 කට වඩා වැඩිවීම




සුදුසු කාලය

- දරු ප්‍රසූතියෙන් දින 7 ක් ඇතුළත
- දරු ප්‍රසූතියෙන් සති 06 කට පසු
- ඔසප් වීමෙන් මුල් දින 7 ඇතුළත
- දරු පිළිසිඳ ගැනීමක් සිදුවී නැති බව තහවුරු කළහැකි ඕනෑම අවස්ථාවක

සැත්කම කරන්නේ කෙසේද?

- උදරයේ කුඩා කැපුමක් සිදු කර මෙම සැත්කම සිදු කරයි
- සැත්කමට ගත වන්නේ මිනිත්තු 10-15 පමණ අඩු කාලයකි



වැදගත්

- සැත්කම නිසා කොන්දේ වේදනාව, ශ්‍රෝණි වේදනාව හෝ ඔසප් වකුගේ අක්‍රමිකතාවන් ඇති නොවේ