

අන්ත: ගර්භාෂ තැන්පතුව කොතරම් කලක් භාවිතා කළ හැකිද?

- විය තැන්පත් කළ පසු අවුරුදු 10 ක කාලයක් දක්වා තබා ගත හැකිය
- ඒ අතර දරුවෙක් අවශ්‍ය වුවහොත් විය පහසුවෙන් ඉවත් කරවා ගෙන ඕනෑම අවස්ථාවක සරුභාවයට පත් විය හැකිය

අන්ත: ගර්භාෂ තැන්පතුව තැන්පත් කිරීමෙන් ඇති විය හැකි ශාරීරික අපහසුතා කවරේද?

- යටි බඩේ වේදනාවක්, මඳ යෝනි රුධිර වහනයක් වැනි අපහසුතා ඇති විය හැකි වුවත් ඒවා ඉතා තාවකාලික වේ
- ඇති වන අපහසුතාවයකදී සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී හෝ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන්ගෙන් උපදෙස් ලබා ගන්න

අන්ත: ගර්භාෂ තැන්පතුව හදිසි පවුල් සැලසුම් ක්‍රමයක් ලෙසද භාවිතා කල හැකිය

වැඩිදුර විස්තර සඳහා වෛද්‍යවරයෙක් හෝ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන්ගේ හමුවන්න

සාර්ථකත්වය

- මෙය නිසි ලෙස තැන්පත් කරන ලද කාන්තාවන්ගෙන් 99.4% කටම අනවශ්‍ය ගැබ් ගැනීමක් ඇති නොවේ.

අන්ත: ගර්භාෂ තැන්පතුව නිසා ලිංගික ක්‍රියාවලියට කිසිසේත්ම බාධාවක් සිදු නොවේ.

පසු විපරම

- තැන්පත් කිරීමෙන් මසකට පමණ පසුව පරීක්ෂා කරවා ගත යුතුය.
- අවශ්‍ය අවස්ථාවකදී නිවසේදීම මෙය පරීක්ෂා කර ගන්නා ආකාරය ඔබගේ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන්ගෙන් අසා දැන ගන්න.

වැඩිදුර උපදෙස් සඳහා හමුවන්න

- සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන්
- වෛද්‍ය නිලධාරීන්
- ලියාපදිංචි වෛද්‍ය නිලධාරීන්
- මහජන සෞඛ්‍ය හෙද සොහොයුරියන්
- පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන්

සුවසර්‍ය 1999



සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ, පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශයේ සහ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ ප්‍රකාශනයකි

නිසි කල රිසි ලෙස දරා සම්පත

ප්‍රීතිමත්



යුග දිවියක් උදෙසා...



අන්ත: ගර්භාෂ තැන්පතුව (IUD)

අන්ත: ගර්භාෂ තැන්පතුව යනු කුමක්ද?

- කාන්තාවකගේ ගර්භාෂයේ තැන්පත් කරන T හැඩැති තඹ අඩංගු ඉතා කුඩා ප්ලාස්ටික් හිපැයුමකි
- මෙය හෝමෝන අඩංගු නොවන පවුල් සැලසුම් ක්‍රමයකි



මෙමගින් අනවශ්‍ය ගැබ් ගැනීමක් වළක්වා ගන්නේ කෙසේද?

- ප්‍රධාන වශයෙන් ඩිම්බය (ස්ත්‍රී ඩීපය) හා ශුක්‍රාණුව (පුරුෂ ඩීපය) එකතු වීම වැළැක්වීමෙන්

අන්ත: ගර්භාෂ තැන්පතුව වඩා සුදුසු කාහටද?

- දරු උපතකින් පසු ඊළඟ දරු ගැබ් දක්වා සුදුසු පරතරයක් තබා ගැනීමට
- ඔලාපොරොත්තු තරම් දරුවන් සිටින නමුත් ස්ත්‍රී ස්ථිර සැත්කමට අකමැති වීමට
- ආර්ථිකවහරණය දක්වා ගැබ් ගැනීමක් වලක්වා ගැනීමට අවශ්‍ය බොහෝ කාන්තාවන්ට



අන්ත: ගර්භාෂ තැන්පතුව නුසුදුසු වන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් කාහටද?

- හේතුව නොදන්නා යෝනි රුධිර වහනයක් ඇත්නම්
- ප්‍රජනක පද්ධතියේ ආසාදනයක් තිබේ නම්
- ගැබ් ගෙල පිළිකා තත්ත්වයක් තිබේ නම්

අන්ත: ගර්භාෂ තැන්පතුව තැන්පත් කිරීමට සුදුසු කුමන අවස්ථාවල දීද?

- ඔසප්වීම ඇරඹී දින 12 ක් ඇතුළත
- දරු ප්‍රසූතියෙන් පැය 48 ක් ඇතුළත
- සාමාන්‍ය දරු උපතක් සිදුවී සති 4 කින් පසු
- සිසේරියන් සැත්කමක් සිදුකර සති 6 කින් පසු
- අනාරක්ෂිත ලිංගික චිකතු වීමකින් පසු දින 5 ක් ඇතුළත හදිසි පවුල් සැලසුම් ක්‍රමයක් ලෙස
- ගබ්සාවක් සිදුවීමෙන් පසු දින 12 ක් ඇතුළත
- වෙනත් පවුල් සැලසුම් ක්‍රමයක් හිසි ලෙස භාවිතා කරමින් සිටි නම් එම ක්‍රමය නැවැත්වූ විගස
- ගර්භණී නොවන බව නිශ්චිතවම තහවුරු කරගත් ඕනෑම අවස්ථාවක

අන්ත: ගර්භාෂ තැන්පතුව තැන්පත් කරන්නේ කෙසේද?

- පවුල් සැලසුම් සායනයකදී වෛද්‍යවරයකු හෝ හෙද සොහොයුරියක් විසින් මෙය තැන්පත් කරනු ඇත
- දරු ප්‍රසූතියක් සිදුවූ වහාම වෛද්‍යවරයෙකු විසින් රෝහලකදී තැන්පත් කරනු ඇත
- මේ සඳහා ගත වන්නේ මිනිත්තු කිහිපයක් පමණි

හිසි ලෙස ගර්භාෂයේ තැන්පත් කළ පසු මෙය ශරීරය තුළ අහිත් අවයව වලට ගමන් නොකරයි.